
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de las aves argentinas

Zotta, A. R.

1940

Cita: Zotta, A. R. (1940) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 007 (03) : 447-472

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

LISTA SISTEMATICA DE LAS AVES ARGENTINAS

ELABORADA POR LA SECCIÓN ORNITOLÓGICA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

(Continuación de la pág. 326, Vol. VII)

SUBORDEN PASSERES

Familia Hirundinidae (Golondrinas)

439. PROGNE Boie, 1826

- * 832. **Progne chalybea domestica** (Vieillot) Golondrina azul doméstica.

Hirundo domestica Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 520. Paraguay.

Progne chalybea domestica, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 240.

Distribución. — Brasil (Pernambuco, Piauí hasta Río Grande do Sul y Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza).

- * 833. **Progne modesta elegans** Baird Golondrina negra doméstica.

Progne elegans Baird, Rev. Amer. Bds., Vol. 1, 1865, p. 275. Argentina (Río Bermejo).

Progne furcata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 351.

Distribución. — Bolivia (Cochabamba hasta Tarija), ocasionalmente en Chile (Paine, O'Higgins), Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Islas Malvinas).

440. PHAEOPROGNE Baird, 1865

- * 834. **Phaeoprogne tapera fusca** (Vieillot) Golondrina de los hornos.

Hirundo fusca Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 510. Paraguay.

Phaeoprogne tapera, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 352, 434.

Distribución. — E. Bolivia, SE. Brasil, Uruguay, emigrando hacia el norte hasta las Guayanas, Venezuela, Colombia, Argentina (por todo el norte hasta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza).

441. PETROCHELIDON Cabanis, 1851

- * 835. **Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota** (Vieillot) Golondrina de rabadilla parda.

Hirundo pyrrhonota Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 519. Paraguay.

Petrochelidon pyrrhonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 354.

Distribución. — Alaska, EE. UU., Canadá, México y Centro América, emigrando hacia el sur hasta Paraguay, Uruguay, Argentina (Entre Ríos, S. Buenos Aires, Tierra del Fuego) ⁽¹⁾.

- * 836. **Petrochelidon pyrrhonota melanogaster** (Swainson) Golondrina de frente roja.

Hirundo melanogaster Swainson, Phil. Mag., Vol. 1, 1827, p. 366. México.

Petrochelidon pyrrhonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 354.

Distribución. — EE. UU., México, en invierno en el NW. de Argentina (Tucumán).

442. STELGIDOPTERYX Baird, 1858

- * 837. **Stelgidopteryx ruficollis ruficollis** (Vieillot) Golondrina de los campos.

Hirundo ruficollis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 523. Brasil (cerca de Río de Janeiro).

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 354.

Distribución. — S. Colombia, E. Ecuador, E. Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

443. ALOPOCHELIDON Ridgway, 1903

- * 838. **Alopocheilidon fucata** (Temminck) Golondrina chica.

Hirundo fucata Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 27, 1822, pl. 161, fig. 1. Brasil.

Alopocheilidon fucatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 353.

Distribución. — Venezuela, Guayana Inglesa, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Formosa, Misiones, hasta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza).

444. PYGOCHELIDON Baird, 1865

- * 839. **Pygocheilidon cyanoleuca cyanoleuca** (Vieillot) Golondrina de pecho blanco.

Hirundo cyanoleuca Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 509. Paraguay.

(1) La localidad Tierra del Fuego la consignamos según un ejemplar de las colecciones del Mus. Arg. de C. Naturales, recientemente incorporado, gracias a la gentileza de nuestro ex-socio, P. W. Reynolds.

Pygochelidon cyanoleuca, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 352.

Distribución. — E. Brasil (Piauhy hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán).

* 840. ***Pygochelidon cyanoleuca patagonica*** (Lafresnaye et d'Orbigny)

Golondrina azul.

Hirundo patagonica Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 69. Argentina (Patagonia).

Pygochelidon cyanoleuca patagonica, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 353, 434.

Distribución. — Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (en todo el territorio) emigrando en invierno hasta Panamá.

445. **RIPARIA** Forster, 1817

* 841. ***Riparia riparia riparia*** (Linné)

Golondrina europea.

Hirundo riparia Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 192. Suecia.

Riparia riparia, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, 1926, p. 391.

Distribución. — Europa, Siberia, Alaska, Canadá, EE. UU. emigrando hacia la India, N. de Africa, México, Centro y Sudamérica hasta Argentina (Tucumán).

446. **HIRUNDO** Linné, 1758

* 842. ***Hirundo rustica erythrogaster*** Boddaert

Golondrina tijereta.

Hirundo erythrogaster Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 45. Guayana Francesa. (Cayena).

Hirundo erythrogastra, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 351.

Distribución. — Alaska, Canadá, Groenlandia occidental, hasta México; emigrando hacia Galápagos, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego).

447. **IRIDOPROCNE** Coues, 1878

* 843. ***Iridoprocne albiventer*** (Boddaert)

Golondrina blanca.

Hirundo albiventer Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 32. Guayana Francesa. (Cayena).

Iridoprocne albiventris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 350.

Distribución. — Trinidad, Guayanas, Venezuela, Colombia, hasta Bolivia, Paraguay, Argentina al E. de Los Andes (Misiones, E. Chaco, N. Santa Fe, accidentalmente en Buenos Aires?).

* 844. ***Iridoprocne leucorrhoea*** (Vieillot)

Golondrina de rabadilla y cejas blancas.

Hirundo leucorrhoea Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 519. Paraguay.

Iridoprocne leucorrhoa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 350.

Distribución. — SE. Brasil, SE. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Corrientes, hasta Buenos Aires, La Pampa).

- * 845. *Iridoprocne leucopyga* (Meyen) Golondrina de rabadilla blanca.

Hirundo leucopyga Meyen, Nov. Act. Acad. Leop. — Carol., Vol. 16, 1834, Suppl., p. 73, pl. 10, fig. 2. Chile (Santiago).

Iridoprocne Meyeni, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 350, 434.

Distribución. — Chile (Aconcagua hasta Tierra del Fuego e islas adyacentes), Paraguay, Argentina (Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, por toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).

Familia **Corvidae** (*Cuervos o Urracas azules*)

Subfamilia **Garrulinae**

448. **CYANOCORAX** Boie, 1826

- * 846. *Cyanocorax chrysops chrysops* (Vieillot) Acahé.

Pica chrysops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 124. Paraguay.

Cyanocorax chrysops, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Paraná, São Paulo), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, E. Formosa, E. Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fe, Corrientes, E. Ríos, ocasionalmente en Buenos Aires).

- * 847. *Cyanocorax chrysops tucumanus* Cabanis Urraca tucumana.

Cyanocorax tucumanus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 216. Argentina (Tucumán).

Cyanocorax chrysops, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.

Distribución. — Argentina (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy).

- * 848. *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot) Urraca morada.

Pica cyanomelas Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 127. Paraguay.

Cyanocorax cyanomelas, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Sgo. del Estero, N. Santa Fe, N. Corrientes).

- * 849. *Cyanocorax caeruleus* (Vieillot) Urraca azul.

Pica caerulea Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 126. Paraguay.

Cyanocorax caeruleus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.

Distribución. — SE. Brasil (São Paulo, Paraná, Santa Catharina, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes, E. Formosa, E. Chaco).

Familia **Cinclidae** (*Mirlos del agua*)

449. **CINCLUS** Borkhausen, 1797

- * 850. **Cinclus schulzi** Cabanis Mirlo del agua.

Cinclus schulzi Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 102, pl. 2, fig. 3. Argentina (Tucumán, cerro « Vayo », error por Bayo).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 357.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Catamarca, Jujuy).

Familia **Troglodytidae** (*Tacuaritas, Ratonas*)

450. **CISTOTHORUS** Cabanis, 1851

- * 851. **Cistothorus platensis hornensis** (Lesson) Ratona aperdizada de Patagonia.

Troglodytes hornensis Lesson, L'Institut, Vol. 2, N° 72, 1834, p. 317. SE. del Cabo de Hornos.

Cistothorus platensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1902, p. 359.

Distribución. — Chile (Santiago hasta el Cabo de Hornos), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego, a lo largo de los Andes patagónicos, Isla de los Estados).

- * 852. **Cistothorus platensis falklandicus** Chapman Ratona aperdizada de Malvinas.

Cistothorus platensis falklandicus Chapman, Am. Mus. Nov., N° 762, 1934, p. 7. Argentina (Islas Malvinas, Isla León Marino).

Cistothorus platensis eydouxii (no *Thryothorus eydouxii* Bonaparte) Wace, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 204.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

- * 853. **Cistothorus platensis platensis** (Latham) Ratona aperdizada de Bs. Aires.

Sylvia platensis Latham, Ind. Orn., Vol. 2, 1790, p. 548. Argentina (Buenos Aires).

Cistothorus platensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 355.

Distribución. — Argentina (Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, hasta el N. de Río Negro).

- * 854. **Cistothorus platensis tucumanus** Hartert et Venturi Ratona aperdizada de Tucumán.

Cistothorus platensis tucumanus Hartert et Venturi, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 163. Argentina (Tucumán).

Cistothorus polyglottus polyglottus (no Vieillot), Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac.

Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 355 (¹).

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 246.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Catamarca, Jujuy, Chaco?).

451. HELEODYTES Cabanis, 1851

* 855. *Heleodytes unicolor* (Lafresnaye)

Ratona grande.

Campylorhynchus unicolor Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 9, 1846, p. 93. Bolivia (Guaya-
rayos).

Heleodytes unicolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 355.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso), Paraguav (²), Argentina (Cór-
doba).

452. TROGLODYTES Vieillot, 1807

* 856. *Troglodytes musculus musculus* Naumann

Ratona, Tacuarita.

Troglodytes musculus Naumann, Naturg. Vög. Deutschl., Vol. 3, 1823 p. 724. Brasil
(Bahía).

Troglodytes musculus guariza, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910 p. 355.

Distribución. — Brasil (Piauhy, hasta Matto Grosso y Paraná), Paraguay, Ar-
gentina (Misiones).

* 857. *Troglodytes musculus rex* Berlepsch et Leverkühn

Tacuara.

Troglodytes furvus (Gm.) subsp. *rex* Berlepsch et Leverkühn, Ornith., Vol. 6, 1890,
p. 6. Bolivia (Samaipata).

Troglodytes musculus guariza, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 355.

Distribución. — SE. Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy hasta el S. de San Juan,
por el este hasta Formosa Chaco y Santiago del Estero).

* 858. *Troglodytes musculus chilensis* Lesson

Cucurucha.

Troglodytes chilensis Lesson, Voyage Coquille, Zool., Vol. 1, 1830, p. 665. Chile (La
Concepción) Cf. Hellmayr, Nov. Zool., Vol. 28, 1921 p. 275.

Troglodytes musculus hornensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 356.

Distribución. — Chile (Atacama, Aconcagua hasta Tierra del Fuego), Argentina
(Mendoza hasta el río Colorado, emigrando en invierno hasta Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires).

* 859. *Troglodytes musculus bonariae* Hellmayr Pájaro ratonero, Ratona oscura.

Troglodytes musculus bonariae Hellmayr, Anz. Orn. Ges. Bay., Vol. 1, 1919, N° 1,
p. 2. Argentina (Bs. Aires, La Plata).

(¹) Cf. HELLMAYR, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 330, Vol. 13, Part. 7, 1934, p. 118.

(²) Cf. ZOTTA, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 3, 1940, p. 364.

Troglodytes musculus hornensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 356.

Troglodytes musculus guariza, Dabbene, Ibid., p. 355.

Distribución. — S. Brasil (Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 860. ***Troglodytes musculus cobbi*** Chubb Ratona de Malvinas.

Troglodytes cobbi Chubb, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 25, 1909, p. 16. Argentina (Islas Malvinas).

Troglodytes musculus cobbi Wace, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 204.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

- * 861. ***Troglodytes solstitialis auricularis*** Cabanis Tricho.

Troglodytes (Uropsila) auricularis Cabanis, Journ. Orn. Vol. 31, 1883, p. 105, pl. 2, fig. 1. Argentina (Tucumán, sierras de Tucumán).

Troglodytes auricularis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 356.

Distribución. — NE. Argentina (Jujuy, Tucumán).

Familia Mimidae (*Calandrias*)

453. MIMUS Boie, 1826

- * 862. ***Mimus patagonicus*** (Lafresnaye et d'Orbigny) Calandria de la Patagonia.

Orpheus patagonicus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 19. Argentina (Patagonia, Río Negro).

Mimus patagonicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 363, 435.

Distribución. — W. de Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires hasta Santa Cruz a través de la Patagonia, accidentalmente en Entre Ríos).

- * 863. ***Mimus saturninus modulator*** (Gould) Calandria.

Orpheus modulator Gould, Proc. Zool. Soc. Lond., Vol. 4, 1836, p. 6. Uruguay (Boca del Río de la Plata), localidad típica según Hellmayr.

Mimus modulator modulator, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 241.

Distribución. — SE. Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, S. Bolivia, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca, hasta Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos).

- * 864. ***Mimus dorsalis*** (Lafresnaye et d'Orbigny) Calandria de dorso castaño.

Orpheus dorsalis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 18. Bolivia (Cochabamba).

Mimus dorsalis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 363.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Tucumán, Jujuy).

- * 865. **Mimus triurus** (Vieillot) Calandria de tres colas.

Turdus triurus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 275. Paraguay.

Mimus triurus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 363.

Distribución. — E. Bolivia, SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones hasta Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Río Negro); ocasionalmente en Chile.

454. DONACOBIVS Swainson, 1831

- * 866. **Donacobius atricapillus atricollis** (Linné) Batará de agallas peladas.

Turdus atricailla (sic) Linné, Syst. Nat., Vol. 1, 12 th. ed., 1766, p. 295. E. Brasil.
Donacobius atricapillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 363.

Distribución. — Guayanas, E. Colombia, Venezuela, E. Perú, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, E. Chaco, NE. Corrientes).

Familia **Turdidae** (Zorzales, Mirlos, etc.) (1)

455. TURDUS Linné, 1758

- * 867. **Turdus falcklandii falcklandii** Quoy et Gaimard Zorzal de las Malvinas.

Turdus falcklandii Quoy et Gaimard, in Freycinet, Voy. Uranie et Physicienne, Zool., livr. 3, 1824, p. 104. Argentina (Islas Malvinas).

Planesticus falklandicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 359.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

- * 868. **Turdus falcklandii magellanicus** King Zorzal de la Patagonia.

Turdus magellanicus King, Proc. Comm. Sci. Corresp. Zool. Soc. Lond., Vol. 1, 1831, p. 14. Estrecho de Magallanes.

Planesticus magellanicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 359.

Turdus magellanicus pambertoni Wetmore, Univ. Calif. Publ. Zool., Vol. 21, 1923, p. 335. Argentina (Río Negro, Cerro Anecón Grande).

Distribución. — Chile (Atacama hasta Tierra del Fuego), Argentina (Isla de los Estados, Tierra del Fuego hasta el Río Colorado a lo largo de los Andes Patagónicos).

- * 869. **Turdus albicollis paraguayensis** (Chubb) Corochiré montés.

Merula albicollis paraguayensis Chubb, Ibis, Vol. 4, 1910, p. 608. Paraguay (Sapucay).

Planesticus albicollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 359, 435.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 870. **Turdus amaurochalinus** Cabanis Zorzal blanco, Chalchalero, Mandioca.

Turdus amaurochalinus Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 5. Brasil.

Planesticus amaurochalinus, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 242.

(1) *Planesticus leucomelas*, Dabbene, Ibid. p. 360, no habita en la Argentina

Merula maranonica (no *Turdus maranonicus* Taczanowski) Arribáizaga, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 8, 1902, p. 151 (1).

Distribución. — SE. Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el N. del país hasta el S. Río Negro).

* 871. ***Turdus rufiventris rufiventris*** Vieillot Zorzal colorado.

Turdus rufiventris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 226. Brasil.

Planesticus rufiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 358.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Goyaz, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), Paraguay, E. Bolivia, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Córdoba y Buenos Aires).

* 872. ***Turdus nigriceps*** Cabanis Isma, Garzón.

Turdus nigriceps (Yelski, M. S.) Cabanis, Journ. Orn., Vol. 22, 1874, p. 97. Perú.

Planesticus nigriceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 361.

Distribución. — SE. Ecuador, E. Perú, E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba).

* 873. ***Turdus subalaris*** (Seeböhm) Sábila cantor.

Merula subalaris (Leverkühn) Seeböhm, Proc. Zool. Soc. Lond., 1887, p. 557. Brasil (Yutubá, São Paulo).

Planesticus crotopezus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 435.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones) (?).

* 874. ***Turdus chiguanco anthracinus*** Burmeister Zorzal negro.

Turdus anthracinus Burmeister, Journ. Orn., Vol. 6, 1858, p. 159. Argentina (Mendoza).

Planesticus fuscater, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 362.

Planesticus fuscater subsp. *amoena*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 362.

Distribución. — S. Bolivia, Chile (Santiago), Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Sgo. del Estero, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa).

456. **PLATYCICHLA** Baird, 1864

* 875. ***Platycichla flavipes flavipes*** (Vieillot) Corochiré-hú.

Turdus flavipes Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 277. Brasil (Río de Janeiro).

(1) Cf. PEREYRA, EL HORNERO, Vol. 6, N° 3, 1937, p. 448.

(2) Cf. ZOTTA, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, N° 3, 1937, p. 477-478.

Platycichla flavipes, Bertoni, Soc. Cient. Argentina, Vol. 75, 1913, p. 95. Misiones, Iguazú.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

457. HYLOCICHLA Baird, 1864

- * 876. *Hylocichla ustulata swainsoni* (Tschudi) Zorzal Norteamericano.

Turdus swainsoni Tschudi, Faun. Perú, Aves, 1845, p. 28. Nuevo nombre por *Merula wilsoni* swainson.

Hylocichla ustulata swainsoni, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 362.

Distribución. — Alaska, Canadá, EE. UU. emigrando en invierno hacia Centro y Sudamérica hasta Argentina (Tucumán).

Familia *Sylviidae* (*Piojitos azules*)

Subfamilia *Poliophtilinae* (1)

458. POLIOPTILA Selater, 1855

- * 877. *Poliophtila dumicola dumicola* (Vieillot) Piojito azulado.

Sylvia dumicola Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 170. Paraguay.

Poliophtila dumicola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 364.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), SE. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Córdoba Santa Fe, Buenos Aires).

Familia *Motacillidae* (*Cachirlas*)

459. ANTHUS Bechstein, 1805

- * 878. *Anthus furcatus furcatus* Lafresnaye et d'Orbigny Cachirla de uña corta.

Anthus furcatus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 27. Argentina (Río Negro, Carmen de Patagones).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, hasta Neuquén, La Pampa, Río Negro).

- * 879. *Anthus lutescens lutescens* Pucheran Cachirla chica.

Anthus lutescens Pucheran, Arch. Mus. Hist. Nat., París, Vol. 7, 1855, p. 343. Brasil (Río de Janeiro).

Anthus lutescens lutescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Vol. 18, 1910, p. 367.

Distribución. — SE. Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza).

(1) *Poliophtila lactea* (no Sharpe) Dabbene (ex Bertoni) corresponde a la avifauna paraguaya.

- * 880. **Anthus correndera catamarcae** Hellmayr Cachirla catamarqueña.
Anthus correndera catamarcae Hellmayr, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 186. Argentina (Catamarca, Lago Colorado, 3400 m.).
 Distribución. — Chile (Antofagasta), Argentina (Los Andes, Catamarca).
- * 881. **Anthus correndera chilensis** (Lesson) Bailarín.
Corydalla chilensis Lesson, Rev. Zool., Vol. 2, 1839, p. 101. Chile.
Anthus correndera (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.
 Distribución. — Chile (Atacama hasta Tierra del Fuego), Argentina (Santa Cruz, Tierra del Fuego).
- * 882. **Anthus correndera grayi** Bonaparte Cachirla de las Malvinas.
Anthus grayi Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 249. Argentina (Islas Malvinas).
Anthus correndera (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 8, 1902, p. 360.
 Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).
- * 883. **Anthus correndera correndera** Vieillot Cachirla, cachila.
Anthus correndera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 491. Paraguay, hasta el Río de la Plata.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.
 Distribución. — SE. Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires hasta Río Negro).
- * 884. **Anthus antarcticus** Cabanis Cachirla antártica.
Anthus antarcticus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 32, 1884, p. 254. Argentina (Georgia del Sur).
 Distribución. — Argentina (Georgia del Sur).
- * 885. **Anthus hellmayri hellmayri** Hartert Cachirla tucumana.
Anthus hellmayri Hartert, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 165. Argentina (Tucumán, Río Salí).
 Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 244.
 Distribución. — Bolivia?, Argentina (Tucumán, Jujuy).
- * 886. **Anthus hellmayri dabbenei** Hellmayr Cachirla del sud.
Anthus hellmayri dabbenei Hellmayr, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 191. Argentina (Neuquén, Río Traful).
 Distribución. — Chile (Cautín), Argentina (Neuquén hasta Chubut a lo largo de los Andes Patagónicos, emigrando en invierno hasta La Rioja, Tucumán, Santa Fe).

- * 887. **Anthus hellmayri brasiliensis** Hellmayr Cachirla cimarrona.
Anthus hellmayri brasiliensis, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 190. Brasil (Campos do Itatiaya).
 Pereyra, Mem. Jardín Zool. La Plata, Argentina, Vol. 9, 1938, p. 239.
Anthus chii (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.
 Distribución. — Brasil (Espírito Santo, São Paulo, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Buenos Aires).
- * 888. **Anthus bogotensis shiptoni** (Chubb) Cachirla de las pajas.
Notiocorys bogotensis shiptoni Chubb, EL HORNERO, Vol. 3, 1923, pp. 34-35, pl. 1, fig. 3. Argentina (Tucumán, Aconquija).
Anthus bogotensis subsp. nov. Hellmayr, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 193.
 Distribución. — Argentina (Tucumán).

Familia **Cyclarhidae** (*Juan chiviros*)

460. CYCLARHIS Swainson, 1824

- * 889. **Cyclarhis gujanensis viridis** (Vieillot) Habiá verde.
Saltator viridis Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 2, livr. 91, 1822, p. 793. Paraguay hasta el Río de la Plata.
Cyclarhis gujanensis viridis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 366.
 Distribución. — SE. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Formosa, Sgo. del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Luis).
- * 890. **Cyclarhis gujanensis ochrocephala** Tschudi Juan Chiviro, Buen cantor.
Cyclarhis ochrocephala Tschudi, Arch. Naturg., Vol. 11, 1845, p. 362. S. Brasil y Argentina (Buenos Aires).
Cyclarhis ochrocephala ochrocephala, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 243.
 Distribución. — SE. Brasil, E. Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

Familia **Vireonidae** (*Cardenales verdes*)

461. VIREO Vieillot, 1808

- * 891. **Vireo virescens chivi** (Vieillot) Chivi-chiví, Gaviero, Contramaestre.
Sylvia chivi Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 174. Paraguay.
Vireosylva chivi chivi, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 365.
 Distribución. — E. Ecuador, E. Perú, Bolivia, SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis).

462. *HYLOPHILUS* Temminck, 1822

- * 892. *Hylophilus poicilotis poicilotis* Temminck Vireo coronado.

Hylophilus poicilotis Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 29, 1822, pl. 173, fig. 2.
Brasil (São Paulo, Ipanema).

Pachysylvia poeilotis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910.
p. 365.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, Minas Geraes, São Paulo, Santa Catharina, Paraná), W. Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia *Coerebidae*463. *DIGLOSSA* Wagler, 1832

- * 893. *Diglossa baritula sittoides* (Lafresnaye et d'Orbigny) Payador.

Serrirostrum sittoides Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 2, in Mag. Zool., Vol. 8,
1838, cl. 2, p. 25. Bolivia (Yungas y Valle Grande).

Diglossa sittoides, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 370.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

464. *DACNIS* Cuvier, 1816

- * 894. *Dacnis cayana paraguayensis* Chubb Saí azul.

Dacnis cayana paraguayensis Chubb, Ibis, Vol. 4, 1910, p. 619. Paraguay (Sapucay).

Dacnis cayana, Bertoni, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 75, 1913, p. 98.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Ceará hasta Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

465. *COEREBE* Vieillot, 1808

- * 895. *Coereba flaveola chloropyga* (Cabanis) Tem-tem.

Certhiola chloropyga Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 97. Brasil (Bahía).

Coereba chloropyga, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 360.

Distribución. — Brasil (Pará, S. Amazonas, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).

466. *ATELEODACNIS* Cassin, 1864

- * 896. *Ateleodacnis speciosa speciosa* (Temminck) Saí.

Sylvia speciosa (Wied MS.) Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 49, 1824, pl. 293,
fig. 2. Brasil (Río de Janeiro).

Dacnis speciosa, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 360.

Distribución. — Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Chaco, Misiones).

Familia **Compsothlypidae** (*Piojitos*)467. **COMPSOTHLYPIS** Cabanis, 1856

- * 897. **Compsothlypis pitiaiyumi pitiaiyumi** (Vieillot) Pitiaiyumi

Sylvia pitiaiyumi Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 267.
Paraguay.

Compsothlypis pitiaiyumi pitiaiyumi, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 243.

Distribución. — Brasil (Maranhao, Piauh, Ceará hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

468. **GEOTHLYPIS** Cabanis, 1847

- * 898. **Geothlypis aequinoctialis velata** (Vieillot) Amarillito.

Sylvia velata Vieillot, Hist. Nat. Ois. Amér. Sept., Vol. 2, 1807, p. 22, pl. 74. Brasil (Río de Janeiro), según Naumburg.

Geothlypis aequinoctialis cucullata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 368.

Distribución. — E. Perú, E. Bolivia, Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso), Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Misiones).

469. **MYIOBORUS** Baird, 1865

- * 899. **Myioborus brunniceps brunniceps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Arañero.

Setophaga brunniceps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 50. Bolivia (Ayupaya).

Myioborus brunneiceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 369.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán).

470. **BASILEUTERUS** Cabanis, 1849

- * 900. **Basileuterus leucoblepharus** (Vieillot) Contramaestre.

Sylvia leucoblephara Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 206.
Paraguay.

Basileuterus leucoblepharus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.

Distribución. — Paraguay, Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe).

- * 901. **Basileuterus bivittatus bivittatus** (Lafresnaye et d'Orbigny) Pula copete canela.

Muscicapa bivittata Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 51. Bolivia (Yungas).

Basileuterus bivittatus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.

Distribución. — SE. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

- * 902. **Basileuterus culicivorus auricapillus** (Swainson) Pula-pula.

Setophaga auricapilla Swainson, Anim. Menag., 1837, p. 293. Brasil.

Basileuterus auricapillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 369.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Ceará hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, La Rioja, Sgo. del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe).

903. **Basileuterus rivularis rivularis** (Wied) Pula garganta leonada.

Muscicapa rivularis Wied, Reise Bras., Vol. 2, 1821, p. 103. Brasil (Bahía, Villa d'Ilhéos).

Basileuterus stragulatulus, Bertoni, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 75, 1913, p. 97.

Distribución. — Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia **Ploceidae** (Gorriones)

Subfamilia **Passerinae**

471. **PASSER** Brisson, 1760

- * 904. **Passer domesticus domesticus** (Linné) Gorrión, Pásula.

Fringilla domestica Linné, Syst. Nat., 10th ed., Vol. 1, 1758, p. 183. Suecia.

Passer domesticus domesticus, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 245.

Distribución. — Europa, excepto Italia, introducido en América. Argentina (en casi todo el territorio, Islas Malvinas).

Familia **Icteridae** (Tordos, Boyeros, etc.)

472. **XANTHORUS** Pallas, 1769

- * 905. **Xanthornus decumanus maculosus** (Chapman) Yapú, Tojo.

Ostinops decumanus maculosus Chapman, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 33, 1920, p. 26. Bolivia (Prov. Cochabamba, Yungas).

Ostinops decumanus (no *Xanthornus decumanus* Pallas), Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 365.

Distribución. — Brasil (Amazonas, Pará hasta Santa Catharina), E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes, Formosa).

473. CACICUS Lacépède, 1799

- * 906. **Cacicus haemorrhous affinis** (Swainson) Boyero de rabadilla encarnada.

Cassicus affinis Swainson, Ornith. Draw., Part. 1, 1834, pl. 2. Brasil.

Cacicus haemorrhous aphanes, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 401.

Distribución. — E. Brasil (Pernambuco hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, N. Santa Fe).

474. ARCHIPLANUS Cabanis, 1851

- * 907. **Archiplanus albirostris** (Vieillot) Boyero de alas amarillas.

Cassicus albirostris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 5, 1816, p. 364. Paraguay?

Cacicus chrysopterus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 365.

Distribución. — E. Bolivia, SE. Brasil (São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 908. **Archiplanus solitarius** (Vieillot) Boyero.

Cassicus solitarius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 5, 1816, p. 364. Paraguay.

Amblycercus solitarius solitarius, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910 p. 402.

Distribución. — E. Colombia, E. Ecuador, E. Perú, Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (E. Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires).

475. PSOMOCOLAX Peters, 1929

- * 909. **Psomocolax oryzivorus oryzivorus** (Gmelin) Boyero grande.

Oriolus oryzivorus Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 386. Guayana Francesa (Cayena).

Cassidix oryzivora, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 366.

Distribución. — S. Panamá, Sudamérica, desde las Guayanas, Venezuela y Colombia hasta Bolivia, Paraguay, SE. Brasil, Argentina (Misiones).

476. MOLOTHRUS Swainson, 1832

- * 910. **Molothrus bonariensis bonariensis** (Gmelin) Renegrido, Tordo.

Tanagra bonariensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 898. Argentina (Buenos Aires).

Molothrus bonariensis bonariensis, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 247.

Distribución. — Bolivia, Paraguay, SE. Brasil, Uruguay, Chile (Coquimbo hasta Valdivia), Argentina (por todo el norte hasta Chubut).

- * 911. **Molothrus rufo-axillaris** Cassin Tordo de pico corto, Violinista.
Molothrus rufo-axillaris Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1866, p. 23. Argentina (Buenos Aires).
Molothrus brevirostris, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 247.
 Distribución. — SE. Brasil (Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro?).
- * 912. **Molothrus badius badius** (Vieillot) Músico, Mulata.
Agelaius badius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 535. Paraguay y Argentina (Río de la Plata).
Molothrus badius, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 247.
 Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Chile (Curicó), Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).
477. **ICTERUS** Daudin, 1800
- * 913. **Icterus cayanensis pyrrhopterus** (Vieillot) Tordo de cobijas canelas.
Agelaius pyrrhopterus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 543. Paraguay.
Icterus pyrrhopterus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.
 Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso), SE. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Sgo. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
478. **AGELAIUS** Vieillot, 1816
- * 914. **Agelaius thilius thilius** (Molina) Trilí.
Turdus thilius Molina, Saggio Stor. Nat., Chile, 1782, p. 250, 345. Chile.
Agelaius thilius thilius, Wetmore, Univ. Calif. Publ. Zool., Vol. 24, 1926, p. 957. NW. Chubut.
 Distribución. — Chile (Atacama hasta Valdivia), Argentina (NW. Chubut).
- * 915. **Agelaius thilius petersii** Laubmann Alferes, Paleta.
Agelaius thilius petersii Laubmann, Verh. Orn. Ges. Bay., Vol. 20, 1934, p. 331. Argentina (N. Santa Fé, Saladillo).
Agelaius thilius chrysocarpus, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 247.
 Distribución. — S. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Sgo. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Chubut).
- * 916. **Agelaius cyanopus** Vieillot Tordo negro de laguna.
Agelaius cyanopus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 552. Paraguay.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 403.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos).

* 917. **Agelaius ruficapillus ruficapillus** Vieillot Varillero.

Agelaius ruficapillus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 536. Paraguay.

Agelaius ruficapillus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 403.

Distribución. — E. Bolivia (Santa Cruz, Tarija), Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

479. **XANTHOPSAR** Ridgway, 1901

* 918. **Xanthopsar flavus** (Gmelin) Tordo de cabeza amarilla.

Oriolus flavus Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 389. Río de la Plata.

Agelaius flavus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1, 1910, p. 403.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, N. Santa Fe, Chaco, Misiones).

480. **AMBLYRAMPHUS** Leach, 1814

* 919. **Amblyramphus holosericeus** (Scopoli) Federal.

Xanthornus holosericeus Scopoli, Del. Flor. et Faun. Insub., Vol. 2, 1786, p. 88. Argentina (Delta del Paraná), según Dabbene.

Amblyramphus holosericeus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 403.

Distribución. — Bolivia, SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

481. **GNORIMOPSAR** Richmond, 1908

* 920 **Gnorimopsar chopi chopi** (Vieillot) Chopi, Charrúa, Tordo Chaqueño.

Agelaius chopi Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 537. Paraguay hasta el Río de la Plata.

Aaptus chopi chopi, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 405.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

482. **NOTIOPSAR** Oberholser, 1921

* 921. **Notiopsar curaeus** (Molina) Boyero chileno.

Turdus curaeus Molina, Saggio Stor. Nat., Chile, 1782, p. 252, 345. Chile.

Curaeus curaeus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego a lo largo de los Andes Patagónicos).

483. PSEUDOLEISTES Selater, 1862

* 922. **Pseudoleistes guirahuro** (Vieillot) Guirahuró.

Agelaius guirahuro Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 545.
Paraguay y Río de la Plata.

Pseudoleistes guirahuro, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.

Distribución. — Brasil (Goyaz, Minas Geraes hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, N. Buenos Aires).

* 923. **Pseudoleistes virescens** (Vieillot) Pecho amarillo, Dragón.

Agelaius virescens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 543.
S. Brasil y Argentina (Buenos Aires).

Pseudoleistes virescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.

Distribución. — SE. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Tucumán, Chaco, Córdoba, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires).

484. LEISTES Vigors, 1825

* 924. **Leistes militaris superciliaris** (Bonaparte) Tordo militar.

Trupialis superciliaris Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 430. Brasil (Matto Grosso), según Berlepsch.

Leistes militaris superciliaris, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 104.

Distribución. — S. Perú, E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Formosa, Chaco, Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos).

485. PEZITES Cabanis, 1851

* 925. **Pezites militaris militaris** (Linné) Loyca, Pecho colorado grande.

Sturnus militaris Linné, Mantissa Plant. altera, 1771, p. 527. Estrecho de Magallanes.
Trupialis militaris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 366.

Distribución. — Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Jujuy, Tucumán, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén hasta Tierra del Fuego).

* 926. **Pezites militaris catamarcanus** Zotta, A. R. Pecho colorado de Catamarca.

Pezites militaris catamarcanus Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, N° 3, 1937, p. 449.
Argentina (Catamarca, Corral Quemado).

Distribución. — Argentina (Catamarca, La Rioja?).

- * 927. **Pezites militaris falklandicus** (Leverkühn) Pecho colorado de Malvinas.
Trupialis militaris (L.) subesp. *falklandica* Leverkühn, Journ. Orn., Vol. 37, 1889,
 p. 108. Argentina (Islas Malvinas).
 Wace, EL HORNERO, Vol. 2, 1921, p. 204.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

- * 928. **Pezites defilippii** (Bonaparte) Pecho colorado mediano.
Trupialis defilippii Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 429. Uruguay (Montevideo).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, NE. Argentina (Tucumán, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes).

486. DOLICHONYX Swainson, 1827

- * 929. **Dolichonyx oryzivorus** (Linné) Charlatán.
Fringilla oryzivora Linné, Syst. Nat., 10th ed., Vol. 1, 1758, p. 179. Cuba y Carolina del Sur.
Dolichonyx oryzivorus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 402.

Distribución. — Canadá, EE. UU. emigrando hacia Sudamérica hasta el SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Tucumán, Misiones, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires).

Familia Tersinidae (*Golondrinas de los naranjos*)

487. TERSINA Vieillot, 1819

- * 930. **Tersina viridis viridis** (Illiger) Golondrina naranjera.
Hirundo viridis Illiger, Prodr. Syst. Mamm. Av., 1811, p. 229. E. Brasil según Hellmayr.
Tersina caerulea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 372.
 Distribución. — E. Brasil (Pernambuco, Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia Thraupidae (*Tangáridos, Siete colores, Naranjeros*)

488. CHLOROPHONIA Bonaparte, 1851

- * 931. **Chlorophonia cyanea cyanea** (Thunberg) Tangara de espalda azul.
Pipra cyanea Thunberg, Mém. Acad. Sci. St. Pétersb., Vol. 8, 1822, p. 284, pl. 8, fig. 1. Brasil (Río de Janeiro).
Chlorophonia chlorocapilla, Bertoni, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 75, 1913, p. 98.
 Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

489. TANAGRA Linné, 1764

- * 932. **Tanagra musica aureata** Vieillot Tangara garganta negra.

Tanagra nigricollis (no de Gmelin, 1789) Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 32, 1819, p. 412. Brasil (Río de Janeiro).

Euphonia nigricollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 373.

Tanagra cyanocephala (no P. L. S. Müller). Pereyra, El Hornero, Vol. 4, N° 1, 1927 p. 33. (ejemplares examinado) (¹).

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul y Matto Grosso), E. Ecuador E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán).

- * 933. **Tanagra chlorotica serrirostris** (Lafresnaye et d'Orbigny) Fruterito de la lija.

Euphonia serrirostris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 30. Bolivia (Santa Cruz, Guarayos).

Euphonia aurea serrirostris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 373.

Distribución. — E. Brasil (Piauhy, Ceará hasta Matto Grosso, São Paulo), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta).

- * 934. **Tanagra violacea aurantiicollis** (Bertoni) Tangara amarilla.

Euphonia aurantiicollis Bertoni, Anal. Ciant. Parag., Vol. 1, N° 1, 1901, p. 94. Paraguay (Puerto Bertoni).

Tanagra aurantiicollis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.

Euphonia violacea (nec Linné) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 374.

Distribución. — E. Brasil (Bahía, Pernambuco hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 935. **Tanagra pectoralis** (Latham) Tangara pecho de oro.

Pipra pectoralis Latham, Ind. Orn., Suppl., p. LVII, 1801. Brasil.

Tanagra pectoralis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 936. **Tanagra chalybea** Mikan Sanasú garganta verde.

Tanagra chalybea Mikan, Del. Faun. Flor. Bras., livr., 4, 1825, pl. (21), figs. 1, 2. Brasil (Ypanema, São Paulo).

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

(¹) Cf. ZOTTA, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 3, 1940.

490. PIPRAEIDEA Swainson, 1827

- * 937. **Pipraeidea melanonota melanonota** (Vieillot) Viuva.

Tanagra melanonota Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 32, 1819, p. 407. Brasil (Río de Janeiro).

Pipraeidea melanonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 374.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Buenos Aires).

- * 938. **Pipraeidea melanonota venezuelensis** (Sclater) Viuva de Venezuela.

Pipraeidea venezuelensis Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., Vol. 24, 1856, p. 265. Venezuela (Caracas).

Pipraeidea melanonota, Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 374.

Pipraeidea melanonota venezuelensis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.

Distribución. — Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

491. CALOSPIZA G. R. Gray, 1840

- * 939. **Calospiza seledon** (P. L. S. Müller) Tangara.

Tanagra seledon P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 158. Brasil (Río de Janeiro).

Calospiza tricolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 375.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Uruguay, Argentina (Misiones).

- * 940. **Calospiza cyanocephala cyanocephala** (P. L. S. Müller) Tangara espalda negra.

Tanagra cyanocephala P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 159. Brasil (Río de Janeiro).

Calospiza cyanocephala cyanocephala Zotta, El Hornero Vol. 7, N° 3, 1940, p.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 941. **Calospiza castanonota** (Sclater) Tangara espalda castaña.

Calliste castanonota Sclater, Contrib. Orn., 1851, Part 2, p. 63. Brasil.

Calospiza pretiosa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 375.

Distribución. — SE. Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 942. **Calospiza peruviana** (Desmarest). Tangara.

Tanagra peruviana Desmarest, Hist. Nat. Tangaras, livr. 9, 1806, texto pl. 11. Brasil (Río de Janeiro).

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Argentina (Misiones, Buenos Aires).

492. *STEPHANOPHORUS* Strickland, 1841

- * 943. *Stephanophorus diadematus* (Temminck) Cardenal azul.

Tanagra diademata Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 41, 1883, p. 243. Brasil.
Stephanophorus leucocephalus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 375.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires).

493. *THRAUPIS* Boie, 1826 (*)

- * 944. *Thraupis cyanoptera* (Vieillot) Sanasú.

Saltator cyanopterus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 104. Brasil.
Thraupis cyanoptera, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Chaco, Buenos Aires?).

- * 945. *Thraupis sayaca sayaca* (Linné) Azulejo.

Tanagra sayaca Linné, Syst. Nat., 12th ed., Vol. 1, 1766, p. 316. Brasil.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.

Distribución. — E. Brasil (Ceará, Maranhao hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 946. *Thraupis sayaca obscura* Naumburg ⁽¹⁾ Verdón.

Thraupis sayaca obscura, Naumburg, Auk, Vol. 41, 1924, p. 111. Bolivia Parotani, (Dept. Cochabamba).

Tanagra sayaca (no de Linné) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 376.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba).

- * 947. *Thraupis bonariensis bonariensis* (Gmelin) Naranjero, Siete colores.

Loxia bonariensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1 (2), 1789, p. 850. Argentina (Bs. Aires).
Tanagra bonariensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires).

(*) *Thraupis episcopus coelestis* (no Spix) Dabbene, no confirmado en la Argentina, Cf. DABBENE, Physis, Vol. 1, 1913, p. 244.

(1) Cf. ZOTTA, A. R., EL HORNERO Vol. 7, N°. 1940, p. 359.

494. *PIRANGA* Vieillot, 1807* 948. *Piranga flava flava* (Vieillot)

Fueguero.

Saltator flavius Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 2, 1822, livr. 91, p. 790. Paraguay.*Piranga flava*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.

Distribución. — E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Misiones).

495. *HABIA* Blyth, 1840* 949. *Habia rubica rubica* (Vieillot)

Había.

Staltator (sic) *rubicus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 107. Paraguay.*Phoenicothera rubica*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376, 436.

Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraes, Espírito Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

496. *TACHYPHONUS* Vieillot, 1816* 950. *Tachyphonus rufus* (Boddaert)

Frutero.

Tangara rufa Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 44. Guayana Francesa (Cayena).*Tachyphonus rufus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.

Distribución. — Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Guayanas hasta Perú, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, N. de Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires).

* 951. *Tachyphonus coronatus* (Vieillot)

Frutero coronado.

Agelaius coronatus Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 2, 1822, livr. 91, p. 711. Paraguay.*Tachyphonus coronatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 377, 436.

Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraes, Matto Grosso, Espírito Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

497. *TRICHTHRAUPIS* Cabanis, 1851* 952. *Trichothraupis melanops* (Vieillot)

Lindo pardo copete amarillo.

Muscicapa melanops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 452. Paraguay.*Trichothraupis melanops*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 377, 436.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).

498. PYRRHOCOMA Cabanis, 1851

- * 953. **Pyrrhocomma ruficeps** (Strickland) Cabecita castaña.

Tachyphonus ruficeps Strickland, Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. 13, 1844, p. 419. Localidad típica desconocida.

Pyrrhocomma ruficeps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 386.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

499. NEMOSIA Vieillot, 1816

- * 954. **Nemosia pileata paraguayensis** Chubb Tangara cabeza azul.

Nemosia pileata paraguayensis Chubb, Ibis, (9), Vol. 4, 1910, p. 629. Paraguay (Sapucay).

Nemosia paraguayensis, Dabbene, (ex-Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 364.

Distribución. — S. Brasil (Minas Geraës, São Paulo, Goyaz, Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Chaco).

500. HEMITHRAUPIS Cabanis, 1851

- * 955. **Hemithraupis guira fosteri** (Sharpe) Pintasilgo.

Nemosia fosteri Sharpe, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 15, 1905, p. 96. Paraguay (Sapucay).

Hemithraupis fosteri, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 364.

Distribución. — E. Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 956. **Hemithraupis guira guira** (Linné) Guiraguagu-beraba.

Motacilla guira Linné, Syst. Nat., 12th ed., Vol. 1, 1766, p. 335. Brasil (Pernambuco).

Hemithraupis guira, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 377.

Distribución. — E. Brasil, E. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

501. THLYPOPSIS Cabanis, 1851

- * 957. **Thlypopsis sordida sordida** (Lafresnaye et d'Orbigny) Tangara de sombrero.

Nemosia sordida Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 28. Bolivia (Yuracares).

Thlypopsis sordida sordida, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 377, 436.

Distribución. — E. Brasil, E. Venezuela, E. Bolivia, Argentina (Misiones, Chaco, N. Santa Fe, Tucumán, Salta).

- * 958. **Thlypopsis ruficeps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabecita colorada.

Sylvia ruficeps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 20. Bolivia (Ayupaya).

Thlypopsis ruficeps, Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 378.

Distribución. — SE. Perú, Bolivia, Argentina (Tucumán).

502. **CHLOROSPINGUS** Cabanis, 1851

- * 959. **Chlorospingus ophthalmicus argentinus** Hellmayr Tangara de ojo blanco.

Chlorospingus venezuelanus argentinus Hellmayr, Anz. Orn. Ges. Bay., Vol. 1, N° 4, 1921, p. 30. Argentina (Jujuy, Cerro de Calilegua).

Chlorospingus albitempora, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 378.

Distribución. — S. Bolivia, NW. Argentina (Jujuy, Salta).

503. **CISSOPIS** Vieillot, 1816

- * 960. **Cissopsis leveriana major** Cabanis Acaemorotí michí.

Cissopsis major Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 144. Brasil.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 365.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

(Continuará)